

# የልጅ እንክብካቤ፡- ኮሮና ቫይረስ (COVID-19) የመገለል እና የመመለስ መስፈርቶች

ለመጨረሻ ጊዜ የዘመነው፡- ሴፕቴምበር 30፣ 2022

መገለል፡- እንዲሁም ለመከላከል የበሽታ ምልክቶች ያለበትን ወይም በCOVID-19 ምርመራ የተረጋገጠ ግለሰብን በአካል በመለየት፡፡ COVID-19 በተለምዶ እንደ ሰው ሲያወራ፣ ሲያስል ወይም ሲያስነጥስ በሚፈጠሩት የመተንፈሻ አካላት ጠብታዎች አማካኝነት የቅርብ ግንኙነት ባላቸው ሰዎች መካከል (በ6 ጫማ አካባቢ) ይተላለፋል፡፡

ልጅዎ የCOVID-19 ምርመራው አዎንታዊ ከሆነ ወይም የ COVID-19 ምልክቶች ካለው፣ ወዲያውኑ ለልጅዎ እንክብካቤ ተቋም ያሳውቁ እና ማግለል ይጀምሩ፡፡ የመገለል ርዝማኔ በግለሰቡ እድሜ፣ የህመሙ ምልክቶች ክብደት እና አዎንታዊው የምርመራ ውጤት ያለው ሰው በትክክል እና ያለማቋረጥ በትክክል የሚሆነውን ጭንብል መልበስ መቻሉ ላይ የተመሰረተ ነው፡፡

ይህ መርጃ የክትባት ሁኔታ ወይም የCOVID-19 ምርመራ ታሪክ ምንም ይህን ምን ለማንኛውም ግለሰብ ተፈጻሚ ይሆናል፡፡ የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የልጅ እድገት ተቋማት ህጎች ህጻናት እና ሰራተኞች የበሽታ ምልክቶች ካላቸው ወይም ለተላላፊ በሽታ የምርመራ ውጤታቸው አዎንታዊ ከሆነ ለጊዜው ከእንክብካቤ እንዲወገዱ ያስገድዳል፡፡

## በመገለል ጊዜ ምን ማድረግ እንዳለብዎት፡-

- የህክምና እንክብካቤ ለማግኘት ካልሆነ በስተቀር፣ በቤት ውስጥ ይቆዩ (ይህን ለማድረግ አስተማማኝ ከሆነ)፡፡
- አይጓዙ፡፡
- በተቻለ መጠን እራስዎን ከሌሎች ሰዎች እና የቤት እንስሳት ይለዩ እና ከተቻለ፣ በተለየ ክፍል እና መታጠቢያ ቤት (ወይም በተጠቀሙ ቁጥር ያጽዱ)፡፡
  - በተለይም ደካማ የበሽታ መከላከል አቅም ካላቸው፣ ለከባድ COVID-19 ከፍተኛ ተጋላጭነት ካላቸው፣ ወይም ካልተከተቡ ወይም የCOVID-19 ክትባታቸው ወቅታዊ ካልሆኑ ማንኛውም ሰው ይለዩ፡፡
- ከሌሎች የቤተሰብ አባላት አጠገብ መሆን ካለብዎት በትክክል የሚሆንዎትን ጭንብል ይልበሱ (ተንከባካቢዎችም ከተገለለው ሰው አጠገብ መሆን ካለባቸው ጭንብል ማድረግ አለባቸው፡፡ ማሳሰቢያ፡- በሚተኛበት ጊዜ ወይም ከ2 አመት በታች ለሆኑ ህጻናት ጭንብል መደረግ የለበትም)፡፡
- በተቻለ መጠን፣ የአየር ሁኔታ እና ለደህንነት በሚፈቅድ መልኩ፣ በተለይም በማንኛውም የጋራ ቦታዎች ብዙ ጎጂ አየር ወደ ቤትዎ ያስገቡ፡፡
- በተለየ ቦታዎች ይመገቡ እና የታመመ ሰው የሚጠቀሙባቸውን ሳህኖች ጓንት ለብሰው ወይም እቃ ማጠቢያ ውስጥ በሙቅ ውሃ ይጠቡ፡፡
- የግል እቃዎችን (ሳህኖች፣ ፎጣዎች፣ ሞባይል ስልኮች፣ ወዘተ) ከሌሎች ጋር አያጋሩ፡፡
- በቤትዎ ሳብኚዎችን አይፍቀዱ፡፡
- ሳሎችዎን እና ሲያስነጥሱ ይሸፈኑ፡፡
- እጆችዎን በተደጋጋሚ ይታጠቡ፡፡
- ምልክቶቹን ይከታተሉ እና የታመሙ ግለሰብ ከሚከተሉት ምልክቶች አንዱን ካለበት እና አስቸኳይ የህክምና እርዳታ ያግኙ፡፡
  - የመተንፈስ ችግር
  - ሙሉ አረፍተ ነገር ለመናገር ትንፋሽ ማጠር
  - ትንፋሻቸውን መያዝ እስከማይችሉ በጣም በማሳል
  - በደረት ላይ የማያቋርጥ ህመም ወይም ግፊት
  - አዲስ ግራ መጋባት
  - መንቃት/ነቅቶ መቆየት አለመቻል
  - ፈዛዛ/ግራጫ/ ሰማያዊ ቀለም ያላቸው ከንፈሮች ወይም የጥፍሮች (በቆዳው ቀለም ላይ በመመስረት)
  - ይህ ዝርዝር ሁሉንም ሊሆኑ የሚችሉ ምልክቶችን አያካትትም፡፡ እባክዎን ለማንኛውም ሌላ ከባድ ወይም እርስዎን የሚያሳስቡ ምልክቶች ወደ ህክምና አቅራቢዎ ይደውሉ፡፡ 911 ይደውሉ ወይም አስፈላጊ ከሆነ ወደ አካባቢዎ የድንገተኛ አደጋ ተቋም ይደውሉ እና COVID-19 ለያዘው ወይም ሊኖርበት ስለሚችል ሰው እንክብካቤ እየፈለጉ እንደሆነ ለአፕሬትሩ ያሳውቁ፡፡



መገለጫ ማሰላት፡- ቀን 0 የህመም ምልክቶች ወይም አዎንታዊ የቫይረስ ምርመራ የመጀመሪያ ቀን ነው። ቀን 1 የህመም ምልክቶች ከታዩ ወይም ናሙናው ከተሰበሰበ በኋላ ያለው የመጀመሪያው ሙሉ ቀን ነው።

**ምልክቶቹ በCOVID-19 ምክንያት ስለመሆናቸው እርግጠኛ ካልሆንኩ ልጄ ወደ ልጅ እንክብካቤ መመለስ ያለበት መቼ ነው?**

ከCOVID-19 ምልክቶች በኋላ መመለስ	
COVID-19 ከተመረመረ	COVID-19 ካልተመረመረ
<ul style="list-style-type: none"> <li>ምርመራው አዎንታዊ ከሆነ፡- ከታች ያለውን ሰንጠረዥ ይመልከቱ።</li> <li>ምርመራው አሉታዊ ከሆነ፡- ከህመም በኋላ ለመመለስ የልጅ እንክብካቤ ተቋሙ መደበኛ መስፈርቶች ሲያሟሉ።</li> <li>ማሳሰቢያ፡ የአንቲቲቮን ምርመራ ወይም የNAAT (ለምሳሌ፣ PCR) ምርመራን መጠቀም ይችላሉ።</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ከጤና እንክብካቤ አቅራቢ የአማራጭ ምርመራ ሰነድ ያቅርቡ እና ከህመም በኋላ ለመመለስ መደበኛ መስፈርቶችን ያሟሉ።</li> <li>ለመመለስ የCOVID-19 በምልክት ላይ የተመሰረተ መስፈርትን ያሟሉ፡-             <ul style="list-style-type: none"> <li>ትኩሳትን የሚቀንሱ መድሃኒቶችን (ለምሳሌ፣ acetaminophen, ibuprofen) ሳይጠቀሙ ትኩሳቱ ከተወ ሲያንስ 24 ሰዓታት በኋላ እና ምልክቶች እየተሻሻሉ ነው፤</li> </ul> </li> <li>እድሜያቸው ከ2 አመት በታች ከሆነ ወይም በትክክል የሚሆናቸውን ጭንብል መልበስ ካልቻሉ፡- ምልክቶቹ ለመጀመሪያ ጊዜ ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ ሲያንስ ከ10 ቀናት በኋላ (ማለትም በቀን 11)</li> <li>እድሜያቸው 2 ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ እና በትክክል የሚሆናቸውን ጭንብል መልበስ ካልቻሉ፡- ምልክቶቹ ለመጀመሪያ ጊዜ ከጀመሩበት (ማለትም በቀን 6) ሲያንስ 5 ቀናት በኋላ እና በልጅ እንክብካቤ ውስጥ እስከ 10ኛው ቀን ድረስ በትክክል የሚሆናቸውን ጭንብል መልበስ ከቻሉ</li> </ul>

**ልጄ ከ2 አመት በታች ነው፣ አዎንታዊ ምርመራ ካደረጉ በኋላ ወደ ልጅ እንክብካቤ መመለስ ያለባቸው መቼ ነው? (ማሳሰቢያ፡ ከ2 አመት በታች የሆኑ ህጻናት በአስተማማኝ መልኩ ጭምብል ማድረግ ስለማይችሉ ረዘም ያለ የመገለጫ ጊዜ አላቸው።)**

ልጅዎ ከ2 አመት በታች ከሆነ፡-

- ልጅዎ መለስተኛ ምልክቶች ካሉት፣ ምልክቶቹ መጀመሪያ በጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ ሲያንስ ከ10 ቀናት በኋላ (ማለትም፣ በቀን 11) ሊመለስ ይችላል።
- ልጅዎ ምንም ዓይነት የህመም ምልክቶች ካልታዩበት፣ አወንታዊ ምርመራው ከተደረገበት ቀን ጀምሮ ሲያንስ ከ10 ቀናት በኋላ (ማለትም፣ በቀን 11) ሊመለስ ይችላል።
- ልጅዎ አዎንታዊ ምርመራ በነበረው ጊዜ ምልክቶች ካልነበረው ነገር ግን በተገለጹበት በማንኛውም ጊዜ ምልክቶች ከታዩ፣ ሰዓቱን እንደገና ይጀምሩ እና ምልክቶች የጀመሩበትን ቀን እንደ ቀን 0 ያስቀምጡ። ምልክቶቹ ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ ሲያንስ ከ10 ቀናት በኋላ (ማለትም በቀን 11) ሊመለሱ ይችላሉ።
- ልጅዎ ከባድ ወይም መካከለኛ COVID-19 ከነበረበት ወይም በሽታ የመከላከል አቅጣጫ የተዳከመ ከሆነ፣ ከመመለሱ በፊት ከጤና እንክብካቤ አቅራቢ ጋር መማከር ይመከራል።

**ልጄ 2 አመት ወይም ከዚያ በላይ ነው፣ አዎንታዊ ምርመራ ካደረጉ በኋላ ወደ ልጅ እንክብካቤ መመለስ ያለባቸው መቼ ነው?**

ልጅዎ 2 አመት ወይም ከዚያ በላይ ከሆነ፣ አዎንታዊ ምርመራ ካደረጉ በኋላ ወደ ልጅ እንክብካቤ ለመመለስ ከዚህ በታች ባለው ሰንጠረዥ ውስጥ ያሉትን መስፈርቶች ይከተሉ።

የCOVID-19 አዎንታዊ ምርመራ ከተደረገ በኋላ ከመገለጫ መመለስ	
የምልክቱ ከባድነት	እድሜው 2 ወይም ከዚያ በላይ
<p><b>ቀላል ህመም ያለው COVID-19</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ቀላል ህመም ማለት የትንፋሽ ማጠር የሌለው ወይም በሃኪም የታዘዙ መድሃኒቶች የሚያስፈልገው ማለት ነው።</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ትኩሳትን የሚቀንሱ መድሃኒቶችን (ለምሳሌ acetaminophen ወይም ibuprofen) ሳይጠቀሙ ሲያንስ ለ24 ሰዓታት ከትኩሳት ነጻ ከሆኑ እና ሌሎች ምልክቶች እየተሻሻሉ ነው። ምልክቶቹ ለመጀመሪያ ጊዜ ከጀመሩበት ጊዜ ሲያንስ ከ5 ቀናት በኋላ (ማለትም በቀን 6) ይመለሱ።</li> <li>አሁንም ትኩሳት እና/ወይም ሌሎች ምልክቶች በቀን 5 ካልተሻሻሉ፡- ትኩሳትን የሚቀንሱ መድሃኒቶችን ሳይጠቀሙ ለ24 ሰዓታት ከትኩሳት ነጻ ከሆኑ እና ሌሎች ምልክቶች ከተሻሻሉ በኋላ ይመለሱ።</li> <li>እና መገለጫ ካበቃ በኋላ፡-</li> <li>እስከ ቀን 10 ድረስ በልጅ እንክብካቤ ውስጥ በትክክል የሚሆን ጭንብል ይልበሱ።</li> <li>አንድ ግለሰብ የአንቲቲቮን ምርመራዎችን ካሉት፣ እነሱን መጠቀምን ያስቡበት።             <ul style="list-style-type: none"> <li>አዎንታዊ ምርመራ፡- ይመለሱ እና ጭምብል ለብሰው ይቀጥሉ እንዲሁም ሌላ የአንቲቲቮን ምርመራ ለማድረግ ሲያንስ 48 ሰዓታት ይጠብቁ (አሁንም ተላላፊ ሊሆን ይችላል)። 2 ተከታታይ አሉታዊ ውጤቶች እስኪኖሩ ድረስ ሲያንስ በ48 ሰዓታት ልዩነት የአንቲቲቮን ምርመራዎች መውሰድም ይቀጥላሉ። (ከቀን 10 በላይ ጭምብል ማድረግ እና ምርመራ መቀጠል ሊኖርብዎት ይችላል)።</li> <li>በ48 ሰዓታት ልዩነት 2 ተከታታይ አሉታዊ ውጤቶች ተወስደዋል፡- ከቀን 10 ቀድመው ይመለሱ እና ጭንብል ያውልቁ።</li> </ul> </li> </ul>
<p><b>መካከለኛ ወይም ከባድ ህመም ወይም ግለሰብ የተዳከመ በሽታ የመከላከል ስርዓት አለው</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>መካከለኛ ህመም ማለት የትንፋሽ ማጠር ወይም የመተንፈስ ችግር ማጋጠም ማለት ነው።</li> <li>ከባድ ህመም ማለት ግለሰቡ ሆስፒታል ተኝቶ እየታከመ ነበር ማለት ነው።</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ምልክቶቹ መጀመሪያ ከጀመሩበት ጊዜ ሲያንስ ከ10 ቀናት በኋላ (ማለትም በቀን 11) ይመለሱ።</li> </ul> <p>ማሳሰቢያ፡ ከባድ ህመም የነበራቸው ወይም የተዳከመ በሽታ የመቋቋም ስርዓት ያላቸው ግለሰቦች መገለጫ ከማብቃታቸው በፊት ከጤና እንክብካቤ አቅራቢያቸው ጋር መማከር አለባቸው። ያለ ቫይረስ ምርመራ መገለጫን ማብቃት ለእነዚህ ግለሰቦች አማራጭ ላይሆን ይችላል።</p>
<p><b>ምንም ምልክቶች የሉም (የበሽታ ምልክት የሌለው ኢንፌክሽን)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ምልክቶች ከታዩ፡- ማገለጫ ምልክቶች በጀመሩበት ቀን እንደገና ከቀን 0 ጀምራል።</li> <li>ምንም ምልክቶች ሳይታዩ ከቀጠሉ፡- ከአዎንታዊ ምርመራ ከተደረገ ሲያንስ ከ5 ቀናት በኋላ (ማለትም በቀን 6) ይመለሱ። እና መገለጫ ካበቃ በኋላ፡-</li> <li>እስከ ቀን 10 ድረስ በልጅ እንክብካቤ ውስጥ በትክክል የሚሆን ጭንብል ይልበሱ።</li> <li>የህመም ምልክቶች ካልታዩ እና አንድ ሰው የአንቲቲቮን ምርመራዎችን ማግኘት ከቻለ፣ እነሱን ለመጠቀም ያስቡበት።             <ul style="list-style-type: none"> <li>አዎንታዊ ምርመራ፡- ይመለሱ እና ጭምብል መልበስን ይቀጥሉ እና ሌላ አንቲቲቮን ምርመራ ለማድረግ ሲያንስ 48 ሰዓታት ይጠብቁ (አሁንም ተላላፊ ሊሆን ይችላል)። 2 ተከታታይ አሉታዊ ምርመራዎች እስኪገኙ በ48 ሰዓታት ልዩነት የአንቲቲቮን ምርመራ ማድረግ ይቀጥላሉ። (ከቀን 10 በላይ ጭምብል መልበስ እና ምርመራ መቀጠል ሊያስፈልግ ይችላል)።</li> <li>2 ተከታታይ አሉታዊ ምርመራዎች በ48 ሰዓታት ልዩነት ተደርገዋል፡- ከቀን 10 ቀድመው ይመለሱ እና ጭንብል ያውልቁ።</li> </ul> </li> </ul>