

# Иммунизация младенцев

## Руководство для родителей

Ниже перечислены вакцины, необходимые вашему ребенку!

При рождении <sup>1,2</sup>	НерВ	МАТ к РСВ <sup>1</sup> 0–7 мес.													
2 месяца <sup>1,2</sup>	НерВ <sub>1–2 мес.<sup>2</sup></sub>	+	DTaP	+	PCV	+	Hib	+	Polio	+	RV				
4 месяца <sup>1,2</sup>	НерВ <sup>3</sup>	+	DTaP	+	PCV	+	Hib	+	Polio	+	RV				
6 месяцев <sup>1,2</sup>	НерВ <sub>6–18 мес.<sup>2</sup></sub>	+	DTaP	+	PCV	+	Hib <sup>4</sup>	+	Polio <sub>6–18 мес.<sup>2</sup></sub>	+	RV <sup>5</sup>	+	Грипп <sup>6</sup>	+	COVID <sup>7</sup>
12 месяцев и старше <sup>1,2</sup>	MMR <sub>12–15 мес.<sup>2</sup></sub>	+	DTaP <sub>15–18 мес.<sup>2</sup></sub>	+	PCV <sub>12–15 мес.<sup>2</sup></sub>	+	Hib <sub>6–18 мес.<sup>2</sup></sub>	+	Chickenpox <sub>12–15 мес.<sup>2</sup></sub>	+	НерА <sup>8</sup> <sub>12–23 мес.<sup>2</sup></sub>	+	Грипп <sup>6</sup>		

Проконсультируйтесь со своим врачом или медсестрой и убедитесь, что ваш ребенок получает все прививки по графику. Многие вакцины объединены вместе, чтобы сократить количество инъекций. Не забудьте попросить карту с датами вакцинации вашего ребенка. Берите ее с собой при каждом посещении врача.

Ниже приведен список заболеваний, от которых будет защищен ваш ребенок:

**НерВ:** гепатит В, серьезное заболевание печени.

**DTaP:** дифтерия, столбняк (спазм жевательных мышц) и коклюш (судорожный кашель).

**PCV:** единая вакцина для профилактики пневмококковых инфекций, защищает от серьезной инфекции крови, легких и головного мозга.

**Hib:** *Haemophilus influenzae (гемофильный грипп)* типа В, серьезная инфекция головного мозга, горла и крови.

**Polio:** полиомиелит, серьезное парализующее заболевание.

**РСВ:** респираторно-синцитиальный вирус, серьезная легочная инфекция.

**RV:** ротавирусная инфекция, серьезное заболевание, вызывающее сильную диарею.

**Грипп:** серьезная инфекция легких.

**MMR:** корь, паротит и краснуха.

**COVID-19:** серьезное и очень заразное заболевание.

**НерА:** гепатит А, серьезное заболевание печени.

**Chickenpox:** ветряная оспа, также называется ветрянкой.

### Примечания к таблице выше:

- С октября по март младенцам в возрасте от рождения до 7 месяцев может потребоваться введение профилактических антител к РСВ (МАТ к РСВ), если вакцина против РСВ не вводилась во время беременности. Некоторым более старшим младенцам в возрасте от 8 до 19 месяцев может потребоваться применение МАТ к РСВ во время второго сезона РСВ.
- В таблице указан возрастной диапазон, в котором следует вводить вакцину.
- В зависимости от используемой вакцины, в возрасте 4 месяцев вашему ребенку может и не потребоваться прививка от Нер В. Спросите об этом своего врача или медсестру.
- В зависимости от используемой вакцины, в возрасте 6 месяцев вашему ребенку может и не потребоваться доза вакцины Hib. Спросите об этом своего врача или медсестру.
- В зависимости от используемой вакцины, в возрасте 6 месяцев вашему ребенку может и не потребоваться доза вакцины RV. Спросите об этом своего врача или медсестру.
- Все дети в возрасте 6 месяцев и старше должны проходить вакцинацию против гриппа осенью или зимой каждого года.
- Вашему ребенку потребуется 2 или 3 дозы, в зависимости от марки вакцины против COVID-19.
- Вашему ребенку потребуется 2 дозы вакцины против Нер А с интервалом не менее 6 месяцев.

