

የክትባት መረጃ መግለጫ፡

Meningococcal ACWY ክትባት፡ ማወቅ የሚገባዎት

Many Vaccine Information Statements are available in Spanish and other languages. See www.immunize.org/vis
Hojas de información sobre vacunas están disponibles en español y en muchos otros idiomas. Visite www.immunize.org/vis

1 መከተብ ለምን አስፈላጊ?

Meningococcal (ሜኒንጅሮካል) በሽታ ከባድ የሆነ በሽታ ሲሆን *Neisseria meningitidis* (ኒዩሶሴሪያ ሜኒንጅሮቲስ) በሚባል ባክቴሪያ አማካይነት የሚፈጠር ነው። ለሜኒንጅሮቲስ (የአእምሮ እና የህብሉ ሰረሰር መስመር ኢንፌክሽን) እና ለደም ኢንፌክሽን ሊዳርግ ይችላል። Meningococcal (ሜኒንጅሮካል) በሽታ አብዛኛውን ጊዜ ያለምንም ማስጠንቀቂያ የሚፈጠር ሲሆን ጤናማ በሆኑ ሰዎች ላይ ይከሰታል።

Meningococcal በሽታ ከሰው ወደ ሰው ቅርብ በሆነ ንክኪ (በማሳል ወይም በመሳሳም) ወይም በረጅም ንክኪ፣ በተለይ አንድ ቤት ውስጥ በሚኖሩ ሰዎች መካከል ሊስፋፋ ይችላል።

ቢያንስ 12 አይነት *N. meningitidis* ያሉ ሲሆን “serogroups” በሚባል ይጠራሉ። Serogroups A፣ B፣ C፣ W፣ እና Y አብዛኛውን የ meningococcal ህመም የሚፈጥሩ ናቸው።

ሁሉም ሰው የ meningococcal በሽታ ሊያዝ ይችላል ነገር ግን አንዳንድ ሰዎች ከሌላ በተለየ የበለጠ ስጋት፡

- ከአንድ ዓመት በላይ የሆኑ ህጻናት
- ከ 16 እስከ 23 ዓመት ውስጥ ያሉ ጎረምሶችና ወጣቶች
- የሰውነት የመከላከል አቅምን የሚጎዳ በሽታ ታማሚዎች
- ከ *N. meningitidis* ጋር ተለይተው የሚሰሩ ማይክሮ ባዮሎጂስቶች
- በወረርሽኝ ጊዜ ስጋት ውስጥ ያሉ ሰዎች

በሚታከምበትም ጊዜ፣ በሽታ ከ 100 ሰዎች ውስጥ ከ 10 እስከ 15 የሚሆኑትን ይገድላል። ከተረፉት 100 ውስጥ ሰዎች ከ10 እስከ 20 ሰዎች እንደ የመስማት ችግር፣ የአእምሮ ጉዳት፣ የኩላሊት ጉዳት፣ እግር መቆረጥ፣ የነርቭስ ሲስተም ችግሮች ወይም ከቆዳ ችግር የተነሳ ጠባሳ ችግሮች ያጋጥማቸዋል።

Meningococcal ACWY ክትባት meningococcal በሽታ ፈጣሪ የሆኑትን serogroups A, C, W, እና Y ን ይከላከላል። የተለየ የ meningococcal ክትባት ከ serogroup B የሚከላከል ክትባት ነው።

2 Meningococcal ACWY ክትባት

Meningococcal conjugate ክትባት (MenACWY) ምግብ እና መድሀኒት አስተዳደር (FDA) ፈቃድ ያለው ሲሆን ከ serogroups A, C, W, እና Y ይከላከላል።

ከ 11 እስከ 18 ዓመት ዕድሜ ላይ ለሚገኙ ታዳጊዎች ሁለት የ MenACWY ዶዎች በተደጋጋሚ ይመከራሉ፡ የመጀመሪያው ዶስ ለ 11 ወይም ለ 12 ዓመት፣ ለ 16 ዓመት ደግሞ የጨመረ ዶስ። አንዳንድ ታዳጊዎች፣ HIV ያለባቸውንም ጨምሮ፣ ተጨማሪ ዶስ ማግኘት አለባቸው። ለበለጠ መረጃ የህክምና እንክብካቤ ሰጪዎን ያማክሩ።

ለታዳጊዎች ተደጋጋሚ ክትባት ከመስጠት በተጨማሪ፣ MenACWY ክትባት ለአንዳንድ ሰዎች መስጠት ይመከራል።

- በ serogroup A፣ C፣ W፣ ወይም Y meningococcal በሽታ ወረርሽኝ ጊዜ ለአደጋ የሚጋለጡ ሰዎች
- በ HIV (ኤችአይቪ) የተያዙ ሰዎች
- ማንኛውም ቆሽቱ የተጎዳ ወይም የወጣ እንዲሁም የ sickle ሴል በሽታ ያለበት ሰው።
- “Persistent complement component deficiency” በሚባል በጣም አልፎ አልፎ በሚከሰት የበሽታ መከላከል አቅም መዳከም ያለበት ሰው
- ማንኛውም eculizumab (ወይም Soliris®) የሚባል መድሀኒት የሚወስድ ሰው
- ከ *N. meningitidis* ጋር ተለይተው የሚሰሩ ማይክሮ ባዮሎጂስቶች
- ለምሳሌ እንደ አፍሪካ ውስጥ ያሉ meningococcal በሽታዎች በብዛት ወደሚገኙባቸው ቦታዎች መጓዣ፣ መኖር
- በዶርም ውስጥ የሚኖሩ አዲስ የኮሌጅ ተማሪዎች
- የአሜሪካ ውትድርና ተቀጣሪዎች

አንዳንድ ሰዎች ከፍተኛ የመከላከያ ዶዝ ያስፈልጋቸዋል። ምን ያህል እና በየሰዓት ጊዜ እንደሚወሰድ እንዲሁም ቡስተር ዶዎችን በተመለከተ የጤና እንብካቤ ሰጪዎን ይጠይቁ።



3 አንዳንድ ሰዎች ይህንን ክትባት ሙሉ-ሰድ የለባቸውም

ክትባቱን ለሚስጥዎ ሰዎ ምንም አይነት ህይወትን አደጋ ላይ ሊጥል የሚችል አለርጂክ ያለብዎ ከሆነ ያሳውቁ። ከዚህ በፊት ከወሰዱት ከ meningococcal ACWY ክትባት ይስ የተነሳ ህይወትን አደጋ ላይ የሚጥል አለርጂክ ከተነሳብዎ ወይም ከዚህ ክትባት ጋር በተያያዘ ከባድ አለርጂክ አጋጥም የሚያውቅ ከሆነ፣ ይህንን ክትባት አይውሰዱ። ስለ ክትባቱ ይዘቶች ክትባት ሰጪዎ ሊነግረዎት ይችላል።

እርጉዝ ለሆነች ወይም ለምታጠባ ሴት ስለዚህ ክትባት ብዙ የሚታወቅ ስጋት የለም። ነገር ግን እርግዝና እና ማጥባት የ MenACWY ክትባትን ላለሙሰድ ምክንያት አይደለም። እርጉዝ ወይም የምታጠባ ሴት ከፍ ያለ በ meningococcal የመያዝ እድል ያላት እንደሆነ ክትባቱን ሙሉ-ሰድ አለባት።

ከባድ ያልሆነ ህመም ማለትም እንደ ጉንፋን ያለ ህመም ካለብዎ ዛሬውኑ ክትባቱን ሊያገኙ ይችላሉ። ከባድ ያለ ወይም በጣም ህመም ላይ ከሆኑ፣ እስኪሻገሩ ድረስ ይጠብቁ። ሀኪምዎ ሊያማክርዎ ይችላል።

4 የክትባተ ምላሽ ስጋት

ክትባትን ጨምሮ በሁሉም መድሀኒቶች የጎንዮሽ ጉዳት የመፈጠር እድል አለ። እነዚህ ሙሉ-ሰድ ሲሆኑ በትንሽ ቀናት ውስጥ በራሳቸው የሚጠፉ ናቸው፤ ነገር ግን ከባድ ህመም ሊፈጠር ይችላል።

Meningococcal ACWY ክትባትን ከሚወስዱ ግማሽ ሰዎች ከክትባት በኋላ ሙሉ-ሰድ ህመም የተወጋበት ቦታ ላይ መቅለት መይም መቁሰል ያጋጥማቸዋል። እነዚህ ችግሮች የሚጠሩ ከሆነ፣ ከ 1 እስከ 2 ቀናት ድረስ ይቆያሉ።

ክትባቱን ከሚወስዱ ሰዎች ውስጥ ዝቅተኛ ፕሮሰንት ያላቸው ሰዎች የጡንቻ እና መገጣጠሚያ ህመም ይሰማቸዋል።

የትኛውንም ክትባት ከወሰዱ በኋላ የሚያጋጥሙ ችግሮች:

- ከህክምና በኋላ፣ ክትባትን ጨምሮ ሰዎች አንዳንድ ጊዜ ራሳቸውን ይስታሉ። ለ15 ደቂቃ መቀመጥ ወይም መተኛት ራስን መሳት እንዲሁም በመውደቅ የሚመጣውን ጉዳት ይከለክላል። የሚያዘርዎ ከሆነ ወይም የእይታ ችግር ካለ ለሀኪምዎ ያሳውቁ።
- ንዳንድ ሰዎች ትኩረት ላይ ከባድ ያለ ህመም ሲሰማቸው የተወጉበት አጃቸውን ማንቀሳቀስ ያስችግራቸዋል። ይህ አልፎ አልፎ የሚከሰት ነው።
- የትኛውም መድኃኒት ከባድ ያለ የአለርጂክ ሊያስነሳ ይችላል። ከክትባት የሚመጡ አለርጂክ ጉዳት ከባድ አልፎ የሚከሰቱ ሲሆኑ 1 ከ 1 ሚሊዮን ይገመታል እናም ከክትባት ጊዜ በትንሽ ሰዓት ውስጥ ይጀምራሉ።

ልክ እንደ ሌላው መድኃኒት፣ ክትባት በጣም ከባድ ጉዳት ወይም ሞት የሚያስከስትልበት በጣም ጠባብ እድል አለ።

የክትባቶች ደህንነት ሁልጊዜ በቅርብ ክትትል ውስጥ ነው። ለበለጠ መረጃ ይህን ይጎብኙ፡ www.cdc.gov/vaccinesafety/

5 አደገኛ የሆነ የአለርጂ ምልክት ቢኖርስ?

ማየት ያለብኝ ምንድነው?

- ስጋት የሆነብዎትን ነገር እንደ ከባድ የአለርጂክ ምልክት፣ ከፍተኛ ትኩረት ወይም ያልተለመዱ ባህሪያትን ይመልከቱ።
ከፍተኛ የሆነ አለርጂክ አንድ ሀይብ፣ የፊት እና ጉሮሮ ማበጥ፣ የመተንፈስ ችግር፣ ከፍተኛ የልብ ምት፣ ማዘር እና ድካም የሚያካትት ሲሆን — ክትባቱን በወሰዱ በጥቂት ደቂቃዎች ወይም ሰአቶች ውስጥ ነው።

ምን ማድረግ አለብኝ?

- ከባድ የሆነ የአለርጂክ ምልክት ወይም ሊቆይ የማይችል አስቸኳይ ከመሰለዎት 9-1-1 በመደወል አቅራቢዎ ወዳለው ሆስፒታል ይሂዱ። ካለበለዚያ ሀኪምዎ ጋር ይደውሉ።
ከዚያ በኋላ የአለርጂው ምልክት ለ “Vaccine Adverse Event Reporting System” (VAERS) ሪፖርት መደረግ አለበት። ሃኪምዎ ይህንን ፋይል ሪፖርት ማድረግ አለበት ወይም እርስዎ ራስዎ የ VAERS ድረ ገጽን በ www.vaers.hhs.gov በመጠቀም ወይም በ 1-800-822-7967 መደወል ይችላሉ። VAERS የህክምና ምክር አይሰጥም።

6 ብሄራዊ የክትባት ጉዳት ካሳ ፕሮግራም


ብሄራዊ የክትባት ጉዳት ካሳ ፕሮግራም (VICP) የፌዴራል ፕሮግራም ሲሆን በአንዳንድ ክትባቶች ምክንያት ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች የሚክስ ድርጅት ነው።

በአንድ ክትባት ምክንያት ጉዳት ደርሶብናል ብለው የሚያስቡ ሰዎች ስለ ፕሮግራሙ መማር እና እንዴት የይገባኛል ፎርም መሙላት አንዳለባቸው መማር ይችላሉ። 1-800-338-2382 ላይ በመደወል ወይም VICP ድረገጹን በመጎብኘት www.hrsa.gov/vaccinecompensation የካሳ ይግባኝ ጥያቄ የማቅረቢያ የጊዜ ገደብ አለ።

7 እንዴት የበለጠ ማወቅ እችላለሁ?

- የጤና እንክብካቤ ሰጪዎን ይጠይቁ። እርሱ ወይም እርሷ የክትባቱን ማብራሪያ ወረቀት ወይም ሌላ የመረጃ ምንጭን መጠቀም ይችላል/ችላላች።
- የአካባቢያዎ ወይም የከተማው የጤና ክፍል ጋር ይደውሉ።
- Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ን ያግኙ።
- ለ 1-800-232-4636 (1-800-CDC-INFO) ይደውሉ - ወይም
- www.cdc.gov/vaccines ድረገጹን ይጎብኙ።

Vaccine Information Statement (Interim)
Meningococcal ACWY Vaccines
Amharic



Office use only