

د معافیت معلوماتو بیان

د تنفسي سنسیشیال ویروس (RSV) وقایوي انټي باډي: هغه څه چې تاسو یې په اړه باید پوه شئ

ولی باید د RSV وقایوي انټي باډي سره معافیت ترلاسه کړئ؟

د تنفسي سنسیشیال ویروس (Respiratory Syncytial Virus, RSV) وقایوي انټي باډي کولی شي د RSV له امله پیدا کیدونکي د سرو شدید ناروغۍ مخه ونیسي.

RSV یو عام تنفسي ویروس دی چې عموماً د خفیف، زکام ډوله علایمو لامل کیږي مگر په سرو هم اغیزه کولی شي. د RSV عفونیت علایمو کې د پږې بهیدل، په اشتها کې کموالی، ټوخی، پرنجی، تبه یا د سینې خرار شامل کېدلی شي.

هرڅوک په RSV اخته کیدی شي، او نږدې ټول ماشومان تر 2 کلنۍ پورې د RSV عفونیت باندې اخته کیږي. پداسې حال کې چې ډیری ماشومان په یوه یا دوه اونيو کې د RSV څخه رغیږي، د RSV عفونیت د تنکي ماشومانو او د ځینې کوچنیو ماشومانو لپاره خطرناک کیدی شي، چې د ساه اخیستلو کې مشکل، د آکسیجن د تپي سطحې او د ډي هایډریشن لامل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو کې RSV د 1 کال څخه کم عمر لرونکي ماشومانو کې د برانشیولیتیز (د سرو د هوا د کوچنیو لارو پرسوب) او د سینه بغل (د سرو عفونیت) ترټولو عام لامل دی. هغه ماشومان چې د RSV له امله ناروغیږي ممکن بستر کیدو ته اړتیا ولري، او ځینې یې حتی شاید مړه شي.

د RSV وقایوي انټي باډيز

د RSV وقایوي انټي باډي (نوعي نوم یې نیرسویماب، سوداگریز نوم یې بیفورټوس د (Beyfortus)) واکسین دی چې په کوچنیو او تنکي ماشومانو کې د شدید RSV ناروغۍ مخه نیسي. انټي باډيز پروټینونه دي چې د بدن د معافیت سیستم یې د زیان لرونکي میکروبونو سره د مبارزې لپاره کاروي. لکه د دودیزو واکسینونو په څیر، وقایوي انټي باډيز واکسینونه دي چې د ځانګړي پټوژن پروړاندې محافظت ورکوي. پداسې حال کې چې دا دواړه واکسینونه دي، د دوی د معافیت ورکولو طریقه مختلف ده. نیرسویماب داسې یو واکسین دی چې ترلاسه کونکي ته مستقیم انټي باډيز ورکوي. دودیز واکسینونه داسې واکسینونه دي چې د ترلاسه کونکي د معافیت سیستم د انټي باډيز تولید کولو ته چمتو کوي.

د RSV موسم پرمهال زیږیدلي ماشومان (عموماً د مني څخه تر پسرلي پورې) باید د زیږون وروسته په 1 اونۍ کې دننه د RSV واکسین یو دوز ترلاسه کړي. ډیری هغه کوچني ماشومان چې مینډې یې د RSV واکسین وکړي، هغوی اړتیا نلري د نیرسویماب واکسین وکړي. دواړه تنکي ماشومان د انټي باډيز په برابرولو سره د شدید RSV څخه محافظت کوي، هغه که د مور څخه ماشوم ته وي یا هم مستقیم ماشوم ته. ډیری تنکي ماشومان ممکن یوازې د مینډو RSV واکسین یا هم د نیرسویماب واکسین محافظت ته اړتیا ولري (دواړو ته نه). په هرصورت، ممکن ځینې حالتونو کې د مور د RSV واکسین کولو وروسته تنکي ماشوم لپاره د نیرسویماب واکسین سپارښتنه هم وشي.

هغه ماشومان چې د RSV موسم څخه بهر زیږیدلي څوک چې عمر ونه یې د 8 میاشتو څخه کم وي باید د هغوی د RSV لومړي موسم (عموماً مني) څخه لږ مخکې د RSV واکسین یو دوز وکړي، مگر هغه ماشومان چې د 8 میاشتو څخه کم عمر لري او تر دې دمه یې یو دوز نه وي کړی هغوی د موسم په جریان کې هرکله کولی شي یو دوز واکسین وکړي.

ځینې کوچني او د تنکي ماشومان چې د شدید RSV ناروغۍ لوړ خطر سره مخ وي هغوی ممکن د خپل RSV دوهم موسم څخه مخکې یا پرمهال د RSV انټي باډي یو دوز ته اړتیا ولري.

د RSV وقایوي انټي باډيز د کوچنیو او تنکي ماشومانو لپاره منظم سپارښتنه شوي نورو واکسینونو سره په ورته وخت کې ورکول کیدی شي.

له خپل روغتياپال سره خبرې وکړئ

- خپل روغتياپال ته ووايي که چېرې د وقايوي انټي باډي ترلاسه کونکي فرد لري:
- د RSV وقايوي انټي باډي (نيرسويماب) يا د دې اجزاو ته د شديد حساسيت غبرگونو تاريخچه،
- د وينې بهيدو اختلال، يا
- متوسط يا شديد حاد ناروغي.

په ځينو مواردو کې، ستاسو د روغتيايي پاملرنې چمتو کونکي ښايي پريکړه وکړي چې د RSV وقايوي انټي باډيز تر راتلونکي ليدنې پورې وځنډوي.

هغه خلک چې کوچنۍ ناروغي لري، لکه زکام، هغوی کولی شي په خوندي توگه د RSV وقايوي انټي باډي ترلاسه کړي. هغه کسان چې په منځني ډول يا سخت ناروغيه وي زياتره تر رغيډو پورې انتظار بايد باسي.

ستاسو روغتياپال کولی شي په دې اړه تاسو ته ډېر معلومات درکړي.

د RSV وقايوي انټي باډيز ته غبرگون خطرونه

د RSV وقايوي انټي باډي ترلاسه کولو وروسته، ستاسې ماشوم ممکن لنډمهال لپاره په هغه ځای کې درد، سوروالی، پرسوب ولري په کوم کې چې واکسين ورته شوی وي، يا دانې ولري.

لکه د نورو درملو په څېر، د RSV واکسين هم په ډېر نادره توگه د سخت حساسيت، نورو جدي ټپونو، يا مړينې سبب گرځېدای شي.

وروسته لدې چې ستاسې ماشوم د روغتون يا کلينیک څخه ووځي د حساسيت غبرگون ورته پېښېدای شي. که تاسو د جدي غبرگون نښې (د مثال په توگه ټپونه، د مخ او ستوني پرسوب، تنفسي ستونزې، د زړه چټک ضربان، ستړيا، يا کمزوري) وليدلې نو، 1-1-9 شمېرې ته زنگ ووهئ او خپل ماشوم تر ټولو نږدې روغتون ته وېښئ.

که تاسې کومې نورې نښې ووينئ چې تاسې انديښمن کوي نو خپل د روغتيا پاملرنې وړاندې کونکي ته زنگ ووهئ.

څرنگه کولی شم نور معلومات لاسته راوړم؟

- له خپل روغتياپال څخه پوښتنې وکړئ.
- خپلې ځايي يا ايالتي روغتيايي څانگې ته زنگ ووهئ.
- د امريکا متحده ايالاتو د خوړو او درملو ادارې ويب سايټ [Drugs@FDA](https://www.fda.gov) ته ورشي: د [FDA \(Food and Drug Administration\)](https://www.fda.gov) [تاييد کړي درمل](https://www.fda.gov).
- د Centers for Disease Control and Prevention (ناروغيو د کنترول او مخنيوي مرکز) (CDC) سره په اړيکه کې شئ: [1-800-232-4636 \(1-800-CDC-INFO\)](https://www.cdc.gov) ته زنگ ووهئ يا [د CDC ويب سايټ](https://www.cdc.gov) <https://www.cdc.gov/rsv/about/prevention.html> ته ورشي.

څه به کيږي که چېرې کومه جدي ستونزه شتون ولري؟

که ستاسې ماشوم په يوه وخت کې د واکسين کولو پرته د RSV وقايوي انټي باډي ترلاسه کړي، او تاسې په جانبي عوارضو يا معکوس غبرگون شکمن شئ، تاسې يا ستاسې د روغتيا پاملرنې وړاندې کونکي کولی شئ د <https://www.fda.gov/medwatch> له لارې يا په 1-800-FDA-1088 شمېره د تليفون له لارې راپور وسپارئ.

که ستاسې ماشوم په يوه وخت کې د RSV وقايوي انټي باډي او واکسين وکړي، او تاسې په جانبي عوارضو يا معکوس غبرگون شکمن شئ، تاسې يا ستاسې د روغتيا پاملرنې وړاندې کونکي بايد د دې راپور د [Vaccine Adverse Event Reporting System \(VAERS\)](https://vaers.hhs.gov/) [د \(واکسينو ضرري پېښو د راپور سيستم\)](https://vaers.hhs.gov/) ته <https://vaers.hhs.gov/> ورکړئ يا [1-800-822-7967](https://vaers.hhs.gov/) ته تليفون وکړئ. په خپل راپور کې يادونه وکړئ چې ستاسې ماشوم د بل واکسين سره د RSV واکسين کړی دی.

يادونه: MedWatch او VAERS يوازې د غبرگونونو د راپور ورکولو لپاره دي. د MedWatch او VAERS کارمندان طبي مشوره نه ورکوي.

